

# 藥品使用指導單

## Paxlovid® (COVID-19口服抗病毒藥物)

### ■ 藥品成分名

Nirmatrelvir、Ritonavir

### ■ 藥品外觀

- Nirmatrelvir：粉紅色，橢圓形，錠劑；標記：[PFE/3CL]
- Ritonavir：白色，橢圓形，錠劑；標記：[H/R9]

### ■ 適應症

Paxlovid® 為專案核准輸入藥品，適用於發病五日內，且具有重症風險因子之成人與12歲以上兒童(體重需大於40公斤)的輕度至中度COVID-19確診者。

### ■ 用法用量

- 每天兩次(早晚服用)，連續使用五天，請勿自行停藥。
- 每次同時服用三顆錠劑(兩顆粉紅色錠、一顆白色錠)。
- 錠劑應整粒吞服，請勿剝半、磨粉或嚼碎。
- 空腹或是飯後服用均可。
- 腎功能異常者服用劑量會有所不同，請遵守醫師與藥師之指示服用。



每天兩次

早上服用  
(黃色藥片)



晚上服用  
(藍色藥片)

每次三顆



連續用五天

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 如果在八小時內想起，可盡快補服。
- 如果超過八小時，請等到下一次服藥時間再使用。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請諮詢醫師或藥師

## ■ 副作用

- 常見副作用：血壓升高、味覺改變(苦味)、腹瀉、肌肉痠痛等。
- 如果出現過敏反應、肝功能異常(如茶色尿、極度疲倦、皮膚或眼睛發黃)、嚴重頭痛、視力改變等症狀，請遵守相關防疫規定，並盡快與本院或相關衛生單位聯絡。

## ■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處，避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 請勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

Paxlovid中文說明書、公費COVID-19治療用口服抗病毒藥物領用方案